

Cirurgia na região genital feminina

Muitas mulheres não gostam do aspecto da sua região genital, levando-as a sentir constrangimento ao usar biquínis, roupas mais justa e, principalmente, no ato sexual. As queixas mais comuns são: o tamanho com exagerada proeminência dos pequenos lábios vaginais; volume de gordura exuberante no monte de Vênus (púbis) e, nas pessoas de mais idade ou que perderam muito peso, o aspecto flácido e murcho da parte mais externa da vulva, que é formada pelos grandes lábios vaginais.

Nos pequenos lábios vaginais proeminentes e longos, é realizada a diminuição com a retirada parcial, visto que eles são muito importantes na proteção e na conservação da umidade necessária para uma boa saúde do introito vaginal e do canal da uretra. Para o volume exagerado da região anterior do púbis, a solução é a diminuição do volume de gordura da região por meio de uma lipoaspiração. A retirada cirúrgica de um pequeno seguimento de pele dos grandes lábios vaginais vai promover um estiramento da região e tratar o aspecto flácido e murcho da parte mais externa da vulva.

Os procedimentos, nesta região, são realizados com o uso de anestésicos locais e sedação leve. Após um pequeno período de observação, a paciente já pode receber alta e voltar para sua residência. Os poucos pontos de sutura são absorvidos pelo organismo e não precisam ser retirados. Edema e equimose (mancha roxa na pele) desaparecem habitualmente em duas semanas e as cicatrizes são praticamente imperceptíveis devido à natureza propícia da pele nessa região do corpo. Pede-se para não ter relação sexual e praticar atividades físicas por trinta dias no pós-operatório. O resultado é considerado após sessenta dias.

Para mais informações:

- Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – www.cirurgioplastica.org.br
- American Society of Plastic Surgery – www.plasticsurgery.org
- International Society of Authentic Plastic Surgery – www.isaps.org